

鹿病防第30号  
令和7年8月25日

各関係機関の長 殿

鹿児島県病虫害防除所長

セグロウリミバエの防除に用いる農薬（植物防疫法第29条第1項の  
規定に基づく措置）の追加等について

日頃から特殊病虫害等の侵入警戒調査および防除等に御理解・御協力を賜り、感謝申し上げます。

さて、令和7年度 技術情報第9号ほか（令和7年6月12日付、7月10日付）において、セグロウリミバエの防除に用いる農薬（植物防疫法第29条第1項に基づく措置）について、農薬一覧表として通知したところですが、新たに農薬1剤（スピノエース顆粒水和剤）を追加した一覧表（別表1）を作成したので、送付いたします。

なお、別表2には、有機栽培で使用できる農薬を整理しましたので、防除の参考としてください。

|                                          |
|------------------------------------------|
| 鹿児島県病虫害防除所<br>TEL：099-245-1157<br>担当者：内村 |
|------------------------------------------|

別表1 セグロウリミバエ防除に用いる農薬

現在、農作物におけるセグロウリミバエの防除に使用可能な登録薬剤はないが、植物防疫法第29条第1項に基づく措置として、発生ほ場では農薬の登録内容を守り、以下の農薬による防除を行うことが可能。

【ウリ科野菜】

きゅうり

| 農薬の名称（屋号抜き）                | 農薬の種類          | 希釈倍率    | 散布量          | 使用時期   | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 総使用回数                                                                  |
|----------------------------|----------------|---------|--------------|--------|------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| アクタラ顆粒水溶剤                  | チアメトキシサム水溶剤    | 2,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 3回以内    | 4回以内<br>(定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内)                                        |
| アグロスリン水和剤                  | シベルメトリン水和剤     | 1,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 5回以内    | 5回以内                                                                   |
| コルト顆粒水溶剤                   | ピリフルキナゾン水和剤    | 4,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 3回以内    | 3回以内                                                                   |
| スカウトフロアブル                  | トラロメトリン水和剤     | 2,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 4回以内    | 4回以内                                                                   |
| スタークル顆粒水溶剤<br>(アルバリン顆粒水溶剤) | ジノテフラン水溶剤      | 2,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 2回以内    | 4回以内<br>(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)              |
| スピノエース顆粒水溶剤                | スピノサド水和剤       | 5,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 2回以内    | 2回以内                                                                   |
| ダントツ水溶剤                    | クロチアニジン水溶剤     | 2,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 3回以内    | 4回以内<br>(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内)                |
| テルスターフロアブル                 | ピフェントリン水和剤     | 4,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 3回以内    | 3回以内                                                                   |
| ブレバソンフロアブル5                | クロラントラニブロール水和剤 | 1,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 3回以内    | 4回以内<br>(定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内)                                        |
| ベネビアOD                     | シアントラニブロール水和剤  | 2,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 3回以内    | 4回以内<br>(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内)                       |
| マブリック水和剤20                 | フルバリネット水和剤     | 4,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 2回以内    | 2回以内                                                                   |
| マラソン乳剤                     | マラソン乳剤         | 1,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 3回以内    | 3回以内                                                                   |
| マラソン粉剤3                    | マラソン粉剤         | 3kg/10a | —            | 収穫前日まで | 散布   | 3回以内    | 3回以内                                                                   |
| モスピラン顆粒水溶剤                 | アセタミプリド水溶剤     | 2,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 3回以内    | 5回以内<br>(粒剤の定植時までの処理は1回以内、2%粒剤の定植後の株元散布は1回以内、散布、くん煙及び1%粒剤の株元散布は合計3回以内) |

きゅうり(施設栽培)

| 農薬の名称（屋号抜き） | 農薬の種類       | 希釈倍率   | 散布量          | 使用時期   | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 総使用回数                                               |
|-------------|-------------|--------|--------------|--------|------|---------|-----------------------------------------------------|
| アドマイヤーフロアブル | イミダクロプリド水和剤 | 4,000倍 | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 3回以内    | 4回以内<br>(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び常溫煙霧は合計3回以内) |

すいか

| 農薬の名称（屋号抜き）                | 農薬の種類          | 希釈倍率    | 散布量          | 使用時期                          | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 総使用回数                                                     |
|----------------------------|----------------|---------|--------------|-------------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------|
| アクタラ顆粒水溶剤                  | チアメトキシサム水溶剤    | 2,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで                        | 散布   | 3回以内    | 4回以内<br>(粒剤の処理は1回以内、散布は3回以内)                              |
| アグロスリン水和剤                  | シベルメトリン水和剤     | 1,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで                        | 散布   | 5回以内    | 5回以内                                                      |
| アドマイヤーフロアブル                | イミダクロプリド水和剤    | 4,000倍  | 100～300L/10a | 収穫3日前まで<br>(ただし、露地栽培については着果後) | 散布   | 3回以内    | 4回以内<br>(定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内)                           |
| エルサン乳剤                     | PAP乳剤          | 1,000倍  | 100～300L/10a | 収穫3日前まで                       | 散布   | 3回以内    | 3回以内                                                      |
| コルト顆粒水溶剤                   | ピリフルキナゾン水和剤    | 4,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで                        | 散布   | 3回以内    | 3回以内                                                      |
| スカウトフロアブル                  | トラロメトリン水和剤     | 2,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで                        | 散布   | 5回以内    | 5回以内                                                      |
| スタークル顆粒水溶剤<br>(アルバリン顆粒水溶剤) | ジノテフラン水溶剤      | 2,000倍  | 100～300L/10a | 収穫7日前まで                       | 散布   | 2回以内    | 4回以内<br>(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内) |
| スピノエース顆粒水溶剤                | スピノサド水和剤       | 5,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで                        | 散布   | 2回以内    | 2回以内                                                      |
| ダントツ水溶剤                    | クロチアニジン水溶剤     | 2,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで                        | 散布   | 3回以内    | 4回以内<br>(定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内)                           |
| ハチハチフロアブル                  | トルフェンピラド水和剤    | 1,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで                        | 散布   | 2回以内    | 2回以内                                                      |
| ブレバソンフロアブル5                | クロラントラニブロール水和剤 | 2,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで                        | 散布   | 3回以内    | 3回以内                                                      |
| マブリック水和剤20                 | フルバリネット水和剤     | 2,000倍  | 100～300L/10a | 収穫3日前まで                       | 散布   | 2回以内    | 2回以内                                                      |
| マラソン乳剤                     | マラソン乳剤         | 1,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで                        | 散布   | 6回以内    | 6回以内                                                      |
| マラソン粉剤3                    | マラソン粉剤         | 3kg/10a | —            | 収穫前日まで                        | 散布   | 6回以内    | 6回以内                                                      |
| モスピラン顆粒水溶剤                 | アセタミプリド水溶剤     | 2,000倍  | 100～300L/10a | 収穫3日前まで                       | 散布   | 3回以内    | 4回以内<br>(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計3回以内)        |

## かぼちゃ

| 農薬の名称（屋号抜き）                | 農薬の種類           | 希釈倍率    | 散布量          | 使用時期                         | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 総使用回数                                          |
|----------------------------|-----------------|---------|--------------|------------------------------|------|---------|------------------------------------------------|
| アドマイヤーフロアブル                | イミダクロプリド水和剤     | 4,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで<br>(ただし、露地栽培については着果後) | 散布   | 2回以内    | 3回以内<br>(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)                |
| エルサン乳剤                     | P A P 乳剤        | 1,000倍  | 100～300L/10a | 収穫3日前まで                      | 散布   | 3回以内    | 3回以内                                           |
| コルト顆粒水和剤                   | ピリフルキナゾン水和剤     | 4,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで                       | 散布   | 3回以内    | 3回以内                                           |
| スタークル顆粒水溶剤<br>(アルバリン顆粒水溶剤) | ジノテフラン水溶剤       | 2,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで                       | 散布   | 2回以内    | 3回以内<br>(定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)   |
| ダントツ水溶剤                    | クロチアニジン水溶剤      | 2,000倍  | 100～300L/10a | 収穫3日前まで                      | 散布   | 3回以内    | 4回以内<br>(定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内)                |
| トリガード液剤                    | シロマジン液剤         | 1,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで                       | 散布   | 3回以内    | 3回以内                                           |
| ベネビアOD                     | シアントラニリブローール水和剤 | 2,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで                       | 散布   | 3回以内    | 3回以内                                           |
| マブリック水和剤 2 0               | フルバリネット水和剤      | 4,000倍  | 100～300L/10a | 収穫21日前まで                     | 散布   | 2回以内    | 2回以内                                           |
| マラソン乳剤                     | マラソン乳剤          | 1,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで                       | 散布   | 5回以内    | 5回以内                                           |
| マラソン粉剤 3                   | マラソン粉剤          | 3kg/10a | ー            | 収穫前日まで                       | 散布   | 5回以内    | 5回以内                                           |
| モスピラン顆粒水溶剤                 | アセタミプリド水溶剤      | 2,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで                       | 散布   | 2回以内    | 3回以内<br>(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) |

## メロン

| 農薬の名称（屋号抜き）                | 農薬の種類            | 希釈倍率    | 散布量          | 使用時期                          | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 総使用回数                                                   |
|----------------------------|------------------|---------|--------------|-------------------------------|------|---------|---------------------------------------------------------|
| アクタラ顆粒水溶剤                  | チアメトキシサム水溶剤      | 2,000倍  | 150～300L/10a | 収穫前日まで                        | 散布   | 3回以内    | 4回以内<br>(定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内)                         |
| アグロスリン水和剤                  | シベルメトリン水和剤       | 1,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで                        | 散布   | 5回以内    | 5回以内                                                    |
| アドマイヤーフロアブル                | イミダクロプリド水和剤      | 4,000倍  | 100～300L/10a | 収穫3日前まで<br>(ただし、露地栽培については着果後) | 散布   | 3回以内    | 4回以内<br>(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内)             |
| エルサン乳剤                     | P A P 乳剤         | 1,000倍  | 100～300L/10a | 収穫3日前まで                       | 散布   | 4回以内    | 4回以内                                                    |
| オリオン水和剤 4 0                | アラニカルブ水和剤        | 1,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで                        | 散布   | 5回以内    | 5回以内                                                    |
| コルト顆粒水和剤                   | ピリフルキナゾン水和剤      | 4,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで                        | 散布   | 3回以内    | 3回以内                                                    |
| スカウトフロアブル                  | トラロメトリン水和剤       | 2,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで                        | 散布   | 5回以内    | 5回以内                                                    |
| スタークル顆粒水溶剤<br>(アルバリン顆粒水溶剤) | ジノテフラン水溶剤        | 2,000倍  | 100～300L/10a | 収穫3日前まで                       | 散布   | 2回以内    | 3回以内<br>(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)             |
| スピノエース顆粒水和剤                | スピノサド水和剤         | 5,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで                        | 散布   | 2回以内    | 2回以内                                                    |
| ダントツ水溶剤                    | クロチアニジン水溶剤       | 2,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで                        | 散布   | 3回以内    | 4回以内<br>(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) |
| トリガード液剤                    | シロマジン液剤          | 1,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで                        | 散布   | 3回以内    | 3回以内                                                    |
| プレバサンフロアブル 5               | クロラントラニリブローール水和剤 | 2,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで                        | 散布   | 3回以内    | 3回以内                                                    |
| マブリック水和剤 2 0               | フルバリネット水和剤       | 2,000倍  | 100～300L/10a | 収穫3日前まで                       | 散布   | 2回以内    | 2回以内                                                    |
| マラソン乳剤                     | マラソン乳剤           | 1,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで                        | 散布   | 3回以内    | 3回以内                                                    |
| マラソン粉剤 3                   | マラソン粉剤           | 3kg/10a | ー            | 収穫前日まで                        | 散布   | 3回以内    | 3回以内                                                    |

## とうがん

| 農薬の名称（屋号抜き）  | 農薬の種類            | 希釈倍率   | 散布量          | 使用時期    | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 総使用回数                               |
|--------------|------------------|--------|--------------|---------|------|---------|-------------------------------------|
| スピノエース顆粒水和剤  | スピノサド水和剤         | 5,000倍 | 100～300L/10a | 収穫前日まで  | 散布   | 2回以内    | 2回以内                                |
| ダントツ水溶剤      | クロチアニジン水溶剤       | 2,000倍 | 100～300L/10a | 収穫3日前まで | 散布   | 3回以内    | 4回以内<br>(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |
| トリガード液剤      | シロマジン液剤          | 1,000倍 | 100～300L/10a | 収穫前日まで  | 散布   | 3回以内    | 3回以内                                |
| プレバサンフロアブル 5 | クロラントラニリブローール水和剤 | 2,000倍 | 100～300L/10a | 収穫前日まで  | 散布   | 3回以内    | 3回以内                                |

## にがうり

| 農薬の名称（屋号抜き）                | 農薬の種類            | 希釈倍率   | 散布量          | 使用時期    | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 総使用回数                           |
|----------------------------|------------------|--------|--------------|---------|------|---------|---------------------------------|
| アクタラ顆粒水溶剤                  | チアメトキシサム水溶剤      | 2,000倍 | 100～300L/10a | 収穫7日前まで | 散布   | 3回以内    | 3回以内                            |
| コルト顆粒水和剤                   | ピリフルキナゾン水和剤      | 4,000倍 | 100～300L/10a | 収穫前日まで  | 散布   | 3回以内    | 3回以内                            |
| スタークル顆粒水溶剤<br>(アルバリン顆粒水溶剤) | ジノテフラン水溶剤        | 2,000倍 | 100～300L/10a | 収穫前日まで  | 散布   | 2回以内    | 3回以内<br>(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内) |
| ダントツ水溶剤                    | クロチアニジン水溶剤       | 2,000倍 | 100～300L/10a | 収穫前日まで  | 散布   | 3回以内    | 4回以内<br>(定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) |
| プレバサンフロアブル 5               | クロラントラニリブローール水和剤 | 2,000倍 | 100～300L/10a | 収穫前日まで  | 散布   | 3回以内    | 3回以内                            |
| マラソン乳剤                     | マラソン乳剤           | 1,000倍 | 100～300L/10a | 収穫前日まで  | 散布   | 3回以内    | 3回以内                            |
| モスピラン顆粒水溶剤                 | アセタミプリド水溶剤       | 4,000倍 | 100～300L/10a | 収穫前日まで  | 散布   | 3回以内    | 3回以内                            |

## 食用へちま

| 農薬の名称（屋号抜き） | 農薬の種類       | 希釈倍率   | 散布量              | 使用時期   | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 総使用回数                               |
|-------------|-------------|--------|------------------|--------|------|---------|-------------------------------------|
| アクタラ顆粒水溶剤   | チアメトキシサム水溶剤 | 2,000倍 | 100～<br>300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 3回以内    | 3回以内                                |
| スピノエース顆粒水和剤 | スピノサド水和剤    | 5,000倍 | 100～<br>300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 2回以内    | 2回以内                                |
| ダントツ水溶剤     | クロチアニジン水溶剤  | 2,000倍 | 100～<br>300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 3回以内    | 4回以内<br>(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) |

## しろり

| 農薬の名称（屋号抜き） | 農薬の種類       | 希釈倍率    | 散布量              | 使用時期    | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 総使用回数 |
|-------------|-------------|---------|------------------|---------|------|---------|-------|
| エルサン乳剤      | P A P 乳剤    | 1,000倍  | 100～<br>300L/10a | 収穫3日前まで | 散布   | 3回以内    | 3回以内  |
| コルト顆粒水和剤    | ビリフルキナゾン水和剤 | 4,000倍  | 100～<br>300L/10a | 収穫前日まで  | 散布   | 3回以内    | 3回以内  |
| マラソン粉剤 3    | マラソン粉剤      | 3kg/10a | ー                | 収穫前日まで  | 散布   | 3回以内    | 3回以内  |

## うり類（漬物用）

（※赤毛ウリ，食用ひょうたん，食用へちま，しろり，漬物用すいか，漬物用まくわうり，漬物用メロン，とうがん，はやとうり，ゆうがお に使用可能）

| 農薬の名称（屋号抜き）                | 農薬の種類      | 希釈倍率   | 散布量              | 使用時期   | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 総使用回数                           |
|----------------------------|------------|--------|------------------|--------|------|---------|---------------------------------|
| スタークル顆粒水溶剤<br>(アルバリン顆粒水溶剤) | ジノテフラン水溶剤  | 2,000倍 | 100～<br>300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 2回以内    | 3回以内<br>(定植時の土壌混和は1回以内，散布は2回以内) |
| マラソン乳剤                     | マラソン乳剤     | 1,000倍 | 100～<br>300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 3回以内    | 3回以内                            |
| モスピラン顆粒水溶剤                 | アセタミプリド水溶剤 | 2,000倍 | 100～<br>300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 3回以内    | 3回以内                            |

## ズッキーニ

| 農薬の名称（屋号抜き）                | 農薬の種類          | 希釈倍率   | 散布量              | 使用時期   | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 総使用回数                                         |
|----------------------------|----------------|--------|------------------|--------|------|---------|-----------------------------------------------|
| コルト顆粒水和剤                   | ビリフルキナゾン水和剤    | 4,000倍 | 100～<br>300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 3回以内    | 3回以内                                          |
| スタークル顆粒水溶剤<br>(アルバリン顆粒水溶剤) | ジノテフラン水溶剤      | 2,000倍 | 100～<br>300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 2回以内    | 4回以内<br>(定植時の土壌混和は1回以内，定植後の株元散布は1回以内，散布は2回以内) |
| スピノエース顆粒水和剤                | スピノサド水和剤       | 5,000倍 | 100～<br>300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 3回以内    | 3回以内                                          |
| ブレバソフロアブル 5                | クロラントラニブロール水和剤 | 1,000倍 | 100～<br>300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 3回以内    | 3回以内                                          |

## まくわうり

| 農薬の名称（屋号抜き）                | 農薬の種類      | 希釈倍率   | 散布量              | 使用時期    | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 総使用回数 |
|----------------------------|------------|--------|------------------|---------|------|---------|-------|
| エルサン乳剤                     | P A P 乳剤   | 1,000倍 | 100～<br>300L/10a | 収穫3日前まで | 散布   | 4回以内    | 4回以内  |
| スタークル顆粒水溶剤<br>(アルバリン顆粒水溶剤) | ジノテフラン水溶剤  | 3,000倍 | 100～<br>300L/10a | 収穫3日前まで | 散布   | 2回以内    | 2回以内  |
| モスピラン顆粒水溶剤                 | アセタミプリド水溶剤 | 4,000倍 | 100～<br>300L/10a | 収穫前日まで  | 散布   | 2回以内    | 2回以内  |

【ナス科野菜】

トマト

| 農薬の名称（屋号抜き）                | 農薬の種類           | 希釈倍率    | 散布量          | 使用時期   | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 総使用回数                                                                     |
|----------------------------|-----------------|---------|--------------|--------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| アクタラ顆粒水溶剤                  | チアメトキシサム水溶剤     | 2,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 3回以内    | 4回以内<br>(定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内)                                           |
| アグロスリン水和剤                  | シベルメトリン水和剤      | 1,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 5回以内    | 5回以内                                                                      |
| アドマイヤーフロアブル                | イミダクロプリド水和剤     | 4,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 2回以内    | 3回以内<br>(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)                               |
| コルト顆粒水和剤                   | ビリフルキナゾン水和剤     | 4,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 3回以内    | 3回以内                                                                      |
| スタークル顆粒水溶剤<br>(アルバリン顆粒水溶剤) | ジノテフラン水溶剤       | 2,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 2回以内    | 5回以内<br>(培土混和及び灌注は合計1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) |
| スピノエース顆粒水和剤                | スピノサド水和剤        | 5,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 2回以内    | 2回以内                                                                      |
| ダントツ水溶剤                    | クロチアニジン水溶剤      | 2,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 3回以内    | 4回以内<br>(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内)                   |
| テルスターフロアブル                 | ビフェントリン水和剤      | 4,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 2回以内    | 2回以内                                                                      |
| トリガード液剤                    | シロマジン液剤         | 1,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 3回以内    | 3回以内                                                                      |
| ブレバソソフロアブル5                | クロラントラニリブロール水和剤 | 1,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 3回以内    | 4回以内<br>(定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内)                                           |
| ベネビアOD                     | シアントラニリブロール水和剤  | 2,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 3回以内    | 5回以内<br>(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の株元灌注は1回以内、定植後の散布は3回以内)            |
| マラソン乳剤                     | マラソン乳剤          | 2,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 5回以内    | 5回以内                                                                      |
| マラソン粉剤3                    | マラソン粉剤          | 3kg/10a | —            | 収穫前日まで | 散布   | 5回以内    | 5回以内                                                                      |
| モスピラン顆粒水溶剤                 | アセタミプリド水溶剤      | 2,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 3回以内    | 4回以内<br>(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計3回以内)                        |

ミニトマト

| 農薬の名称（屋号抜き）                | 農薬の種類           | 希釈倍率   | 散布量          | 使用時期   | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 総使用回数                                                                     |
|----------------------------|-----------------|--------|--------------|--------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| アクタラ顆粒水溶剤                  | チアメトキシサム水溶剤     | 2,000倍 | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 2回以内    | 3回以内<br>(粒剤の処理は1回以内、散布は2回以内)                                              |
| アグロスリン水和剤                  | シベルメトリン水和剤      | 2,000倍 | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 2回以内    | 2回以内                                                                      |
| アドマイヤーフロアブル                | イミダクロプリド水和剤     | 4,000倍 | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 2回以内    | 3回以内<br>(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)                               |
| コルト顆粒水和剤                   | ビリフルキナゾン水和剤     | 4,000倍 | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 3回以内    | 3回以内                                                                      |
| スタークル顆粒水溶剤<br>(アルバリン顆粒水溶剤) | ジノテフラン水溶剤       | 2,000倍 | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 2回以内    | 5回以内<br>(培土混和及び灌注は合計1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) |
| スピノエース顆粒水和剤                | スピノサド水和剤        | 5,000倍 | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 2回以内    | 2回以内                                                                      |
| ダントツ水溶剤                    | クロチアニジン水溶剤      | 2,000倍 | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 3回以内    | 4回以内<br>(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内)                   |
| テルスターフロアブル                 | ビフェントリン水和剤      | 4,000倍 | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 2回以内    | 2回以内                                                                      |
| トリガード液剤                    | シロマジン液剤         | 1,000倍 | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 2回以内    | 2回以内                                                                      |
| ブレバソソフロアブル5                | クロラントラニリブロール水和剤 | 2,000倍 | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 3回以内    | 4回以内<br>(灌注は1回以内、散布は3回以内)                                                 |
| ベネビアOD                     | シアントラニリブロール水和剤  | 2,000倍 | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 3回以内    | 5回以内<br>(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の株元灌注は1回以内、定植後の散布は3回以内)            |
| モスピラン顆粒水溶剤                 | アセタミプリド水溶剤      | 2,000倍 | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 3回以内    | 4回以内<br>(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計3回以内)                        |

ピーマン

| 農薬の名称（屋号抜き）                | 農薬の種類           | 希釈倍率    | 散布量          | 使用時期   | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 総使用回数                                                   |
|----------------------------|-----------------|---------|--------------|--------|------|---------|---------------------------------------------------------|
| アクタラ顆粒水溶剤                  | チアメトキシサム水溶剤     | 2,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 3回以内    | 4回以内<br>(定植時までの処理は1回以内，散布は3回以内)                         |
| アグロスリン水和剤                  | シベルメトリン水和剤      | 2,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 5回以内    | 5回以内                                                    |
| コルト顆粒水和剤                   | ピリフルキナゾン水和剤     | 4,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 2回以内    | 2回以内                                                    |
| スタークル顆粒水溶剤<br>(アルバリン顆粒水溶剤) | ジノテフラン水溶剤       | 2,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 2回以内    | 3回以内<br>(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内，散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) |
| スピノエース顆粒水和剤                | スピノサド水和剤        | 5,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 2回以内    | 2回以内                                                    |
| ダントツ水溶剤                    | クロチアニジン水溶剤      | 2,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 2回以内    | 3回以内<br>(定植時までの処理は1回以内，散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)             |
| ブレバソフロアブル5                 | クロラントラニリブロール水和剤 | 1,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 2回以内    | 3回以内<br>(灌注は1回以内，散布は2回以内)                               |
| ベネビアOD                     | シアントラニリブロール水和剤  | 2,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 3回以内    | 4回以内<br>(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内，定植後の散布は3回以内)        |
| マラソン乳剤                     | マラソン乳剤          | 2,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 5回以内    | 5回以内                                                    |
| マラソン粉剤3                    | マラソン粉剤          | 3kg/10a | ー            | 収穫前日まで | 散布   | 5回以内    | 5回以内                                                    |
| モスピラン顆粒水溶剤                 | アセタミプリド水溶剤      | 4,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 2回以内    | 3回以内<br>(粒剤の定植時までの処理は1回以内，散布，くん煙及び定植後の株元散布は合計2回以内)      |

ピーマン（施設栽培）

| 農薬の名称（屋号抜き） | 農薬の種類       | 希釈倍率   | 散布量          | 使用時期   | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 総使用回数                                        |
|-------------|-------------|--------|--------------|--------|------|---------|----------------------------------------------|
| アドマイヤーフロアブル | イミダクロプリド水和剤 | 4,000倍 | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 2回以内    | 3回以内<br>(育苗期の株元散布および定植時の土壌混和は合計1回以内，散布は2回以内) |

とうがらし類

| 農薬の名称（屋号抜き）                | 農薬の種類           | 希釈倍率   | 散布量          | 使用時期   | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 総使用回数                                                     |
|----------------------------|-----------------|--------|--------------|--------|------|---------|-----------------------------------------------------------|
| スタークル顆粒水溶剤<br>(アルバリン顆粒水溶剤) | ジノテフラン水溶剤       | 2,000倍 | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 2回以内    | 4回以内<br>(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内，定植後の株元散布は1回以内，散布は2回以内) |
| ダントツ水溶剤                    | クロチアニジン水溶剤      | 2,000倍 | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 3回以内    | 3回以内                                                      |
| ブレバソフロアブル5                 | クロラントラニリブロール水和剤 | 1,000倍 | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 3回以内    | 4回以内<br>(灌注は1回以内，散布は3回以内)                                 |

とうがらし類（ししとうを除く）

| 農薬の名称（屋号抜き） | 農薬の種類       | 希釈倍率   | 散布量          | 使用時期   | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 総使用回数                           |
|-------------|-------------|--------|--------------|--------|------|---------|---------------------------------|
| アクタラ顆粒水溶剤   | チアメトキシサム水溶剤 | 3,000倍 | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 3回以内    | 4回以内<br>(定植時の植穴処理は1回以内，散布は3回以内) |

とうがらし類（甘長とうがらしを除く）

| 農薬の名称（屋号抜き） | 農薬の種類       | 希釈倍率   | 散布量          | 使用時期   | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 総使用回数 |
|-------------|-------------|--------|--------------|--------|------|---------|-------|
| コルト顆粒水和剤    | ピリフルキナゾン水和剤 | 4,000倍 | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 2回以内    | 2回以内  |

ししとう

| 農薬の名称（屋号抜き） | 農薬の種類          | 希釈倍率    | 散布量          | 使用時期   | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 総使用回数                           |
|-------------|----------------|---------|--------------|--------|------|---------|---------------------------------|
| アクタラ顆粒水溶剤   | チアメトキシサム水溶剤    | 3,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 3回以内    | 4回以内<br>(定植時の植穴処理は1回以内，散布は3回以内) |
| スピノエース顆粒水和剤 | スピノサド水和剤       | 20,000倍 | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 2回以内    | 2回以内                            |
| ベネビアOD      | シアントラニリブロール水和剤 | 2,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 3回以内    | 4回以内<br>(灌注は1回以内，散布は3回以内)       |

【その他】

パッションフルーツ

| 農薬の名称（屋号抜き） | 農薬の種類      | 希釈倍率   | 散布量          | 使用時期     | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 総使用回数 |
|-------------|------------|--------|--------------|----------|------|---------|-------|
| モスピラン顆粒水溶剤  | アセタミプリド水溶剤 | 2,000倍 | 200～700L/10a | 収穫30日前まで | 散布   | 2回以内    | 2回以内  |

スモモ

| 農薬の名称（屋号抜き）                | 農薬の種類       | 希釈倍率   | 散布量          | 使用時期     | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 総使用回数 |
|----------------------------|-------------|--------|--------------|----------|------|---------|-------|
| アクタラ顆粒水溶剤                  | チアメトキシサム水溶剤 | 2,000倍 | 200～700L/10a | 収穫7日前まで  | 散布   | 2回以内    | 2回以内  |
| アグロスリン水和剤                  | シベルメトリン水和剤  | 1,000倍 | 200～700L/10a | 収穫前日まで   | 散布   | 2回以内    | 2回以内  |
| オリオン水和剤 40                 | アラニカルブ水和剤   | 1,000倍 | 200～700L/10a | 収穫7日前まで  | 散布   | 3回以内    | 3回以内  |
| コルト顆粒水和剤                   | ビリフルキナゾン水和剤 | 2,000倍 | 200～700L/10a | 収穫前日まで   | 散布   | 3回以内    | 3回以内  |
| スカウトフロアブル                  | トラロメトリン水和剤  | 2,000倍 | 200～700L/10a | 収穫前日まで   | 散布   | 3回以内    | 3回以内  |
| スタークル顆粒水溶剤<br>(アルバリン顆粒水溶剤) | ジノテフラン水溶剤   | 2,000倍 | 200～700L/10a | 収穫前日まで   | 散布   | 3回以内    | 3回以内  |
| ダントツ水溶剤                    | クロチアニジン水溶剤  | 2,000倍 | 200～700L/10a | 収穫3日前まで  | 散布   | 3回以内    | 3回以内  |
| テルスターフロアブル                 | ビフェントリン水和剤  | 3,000倍 | 200～700L/10a | 収穫前日まで   | 散布   | 2回以内    | 2回以内  |
| ハチハチフロアブル                  | トルフェンピラド水和剤 | 2,000倍 | 200～700L/10a | 収穫14日前まで | 散布   | 2回以内    | 2回以内  |
| モスピラン顆粒水溶剤                 | アセタミプリド水溶剤  | 2,000倍 | 200～700L/10a | 収穫前日まで   | 散布   | 3回以内    | 3回以内  |

パパイヤ

| 農薬の名称（屋号抜き） | 農薬の種類      | 希釈倍率   | 散布量          | 使用時期    | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 総使用回数 |
|-------------|------------|--------|--------------|---------|------|---------|-------|
| ダントツ水溶剤     | クロチアニジン水溶剤 | 2,000倍 | 200～700L/10a | 収穫3日前まで | 散布   | 3回以内    | 3回以内  |

ビタヤ（※通称：ドラゴンフルーツ）

| 農薬の名称（屋号抜き） | 農薬の種類       | 希釈倍率   | 散布量          | 使用時期    | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 総使用回数 |
|-------------|-------------|--------|--------------|---------|------|---------|-------|
| アドマイヤーフロアブル | イミダクロプリド水和剤 | 2,000倍 | 100～300L/10a | 収穫7日前まで | 散布   | 2回以内    | 2回以内  |

グアバ（果実）

| 農薬の名称（屋号抜き） | 農薬の種類       | 希釈倍率   | 散布量          | 使用時期    | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 総使用回数 |
|-------------|-------------|--------|--------------|---------|------|---------|-------|
| アクタラ顆粒水溶剤   | チアメトキシサム水溶剤 | 2,000倍 | 200～700L/10a | 収穫7日前まで | 散布   | 2回以内    | 2回以内  |

さやいんげん

| 農薬の名称（屋号抜き）                | 農薬の種類           | 希釈倍率    | 散布量          | 使用時期    | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 総使用回数                       |
|----------------------------|-----------------|---------|--------------|---------|------|---------|-----------------------------|
| エルサン乳剤                     | P A P 乳剤        | 1,000倍  | 100～300L/10a | 収穫7日前まで | 散布   | 1回      | 1回                          |
| コルト顆粒水和剤                   | ビリフルキナゾン水和剤     | 4,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで  | 散布   | 3回以内    | 3回以内                        |
| スタークル顆粒水溶剤<br>(アルバリン顆粒水溶剤) | ジノテフラン水溶剤       | 2,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで  | 散布   | 2回以内    | 3回以内<br>(株元散布は1回以内、散布は2回以内) |
| スピノエース顆粒水和剤                | スピノサド水和剤        | 5,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで  | 散布   | 3回以内    | 3回以内                        |
| プレバソソフロアブル5                | クロラントラニリブロール水和剤 | 2,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで  | 散布   | 3回以内    | 3回以内                        |
| ベネビアOD                     | シアントラニリブロール水和剤  | 2,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで  | 散布   | 3回以内    | 3回以内                        |
| マラソン粉剤3                    | マラソン粉剤          | 3kg/10a | —            | 収穫7日前まで | 散布   | 3回以内    | 3回以内                        |
| モスピラン顆粒水溶剤                 | アセタミプリド水溶剤      | 2,000倍  | 100～300L/10a | 収穫前日まで  | 散布   | 3回以内    | 3回以内                        |

豆類(未成熟、ただし、えだまめを除く)

| 農薬の名称（屋号抜き） | 農薬の種類      | 希釈倍率   | 散布量          | 使用時期    | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 総使用回数 |
|-------------|------------|--------|--------------|---------|------|---------|-------|
| ダントツ水溶剤     | クロチアニジン水溶剤 | 2,000倍 | 100～300L/10a | 収穫3日前まで | 散布   | 3回以内    | 3回以内  |

豆類(未成熟)

| 農薬の名称（屋号抜き） | 農薬の種類  | 希釈倍率   | 散布量          | 使用時期    | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 総使用回数 |
|-------------|--------|--------|--------------|---------|------|---------|-------|
| マラソン乳剤      | マラソン乳剤 | 1,000倍 | 100～300L/10a | 収穫7日前まで | 散布   | 3回以内    | 3回以内  |

**別表2 セグロウリミバエ防除に用いる農薬（有機農業で使用できる農薬）**

現在、農作物におけるセグロウリミバエの防除に使用可能な登録薬剤はないが、植物防疫法第29条第1項に基づく措置として、発生ほ場では農薬の登録内容を守り、以下の農薬による防除を行うことが可能。

**【ウリ科野菜】**

**きゅうり**

| 農薬の名称（屋号抜き） | 農薬の種類    | 希釈倍率   | 散布量          | 使用時期   | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 総使用回数 |
|-------------|----------|--------|--------------|--------|------|---------|-------|
| スピノエース顆粒水和剤 | スピノサド水和剤 | 5,000倍 | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 2回以内    | 2回以内  |

**すいか**

| 農薬の名称（屋号抜き） | 農薬の種類    | 希釈倍率   | 散布量          | 使用時期   | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 総使用回数 |
|-------------|----------|--------|--------------|--------|------|---------|-------|
| スピノエース顆粒水和剤 | スピノサド水和剤 | 5,000倍 | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 2回以内    | 2回以内  |

**メロン**

| 農薬の名称（屋号抜き） | 農薬の種類    | 希釈倍率   | 散布量          | 使用時期   | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 総使用回数 |
|-------------|----------|--------|--------------|--------|------|---------|-------|
| スピノエース顆粒水和剤 | スピノサド水和剤 | 5,000倍 | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 2回以内    | 2回以内  |

**とうがん**

| 農薬の名称（屋号抜き） | 農薬の種類    | 希釈倍率   | 散布量          | 使用時期   | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 総使用回数 |
|-------------|----------|--------|--------------|--------|------|---------|-------|
| スピノエース顆粒水和剤 | スピノサド水和剤 | 5,000倍 | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 2回以内    | 2回以内  |

**食用へちま**

| 農薬の名称（屋号抜き） | 農薬の種類    | 希釈倍率   | 散布量          | 使用時期   | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 総使用回数 |
|-------------|----------|--------|--------------|--------|------|---------|-------|
| スピノエース顆粒水和剤 | スピノサド水和剤 | 5,000倍 | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 2回以内    | 2回以内  |

**ズッキーニ**

| 農薬の名称（屋号抜き） | 農薬の種類    | 希釈倍率   | 散布量          | 使用時期   | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 総使用回数 |
|-------------|----------|--------|--------------|--------|------|---------|-------|
| スピノエース顆粒水和剤 | スピノサド水和剤 | 5,000倍 | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 3回以内    | 3回以内  |

**【ナス科野菜】**

**トマト**

| 農薬の名称（屋号抜き） | 農薬の種類    | 希釈倍率   | 散布量          | 使用時期   | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 総使用回数 |
|-------------|----------|--------|--------------|--------|------|---------|-------|
| スピノエース顆粒水和剤 | スピノサド水和剤 | 5,000倍 | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 2回以内    | 2回以内  |

**ミニトマト**

| 農薬の名称（屋号抜き） | 農薬の種類    | 希釈倍率   | 散布量          | 使用時期   | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 総使用回数 |
|-------------|----------|--------|--------------|--------|------|---------|-------|
| スピノエース顆粒水和剤 | スピノサド水和剤 | 5,000倍 | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 2回以内    | 2回以内  |

**ピーマン**

| 農薬の名称（屋号抜き） | 農薬の種類    | 希釈倍率   | 散布量          | 使用時期   | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 総使用回数 |
|-------------|----------|--------|--------------|--------|------|---------|-------|
| スピノエース顆粒水和剤 | スピノサド水和剤 | 5,000倍 | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 2回以内    | 2回以内  |

**ししとう**

| 農薬の名称（屋号抜き） | 農薬の種類    | 希釈倍率    | 散布量          | 使用時期   | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 総使用回数 |
|-------------|----------|---------|--------------|--------|------|---------|-------|
| スピノエース顆粒水和剤 | スピノサド水和剤 | 20,000倍 | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 2回以内    | 2回以内  |

**【その他】**

**さやいんげん**

| 農薬の名称（屋号抜き） | 農薬の種類    | 希釈倍率   | 散布量          | 使用時期   | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 総使用回数 |
|-------------|----------|--------|--------------|--------|------|---------|-------|
| スピノエース顆粒水和剤 | スピノサド水和剤 | 5,000倍 | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 散布   | 3回以内    | 3回以内  |